

FACTEURS DE HAUT RISQUE DE TND

Frère ou sœur ou parent de 1er degré ayant un TND

Exposition prénatale à un toxique majeur du neuro-développement (alcool, certains antiépileptiques)

Grande prématurité (moins de 32 semaines d'aménorrhée)

Poids de naissance inférieur à 1 500 g

Encéphalopathies aiguës néonatales (incluant convulsions)

Anomalies cérébrales de pronostic incertain (ventriculomégalie, agénésie corps calleux, etc.)

Microcéphalie (PC < -2 DS, congénitale ou secondaire)

Infections congénitales ou néonatales (CMV, toxoplasmose, rubéole, méningites / encéphalites, etc.)

Syndromes génétiques pouvant affecter le neuro-développement

Cardiopathies congénitales complexes opérées

Chirurgie majeure (cerveau, abdomen, thorax)

Ictère néonatal sévère, y compris à terme (bilirubine >400 µmol/l)

COMPORTEMENTS INSTINCTUELS, SENSORIELS, EMOTIONNELS PARTICULIERS

Fonctions physiologiques instinctuelles (sommeil, alimentation) :

Troubles durables et quasi quotidiens du sommeil (endormissement, réveils nocturnes)

Grande sélectivité alimentaire inhabituelle pour l'âge (préfère les structures lisses, refuse les morceaux, a une aversion pour les aliments d'une certaine couleur, etc.)

Difficultés de prises alimentaires (durée des repas très longue, réflexe nauséux massif)

Profil sensoriel et sensori-moteur particulier :

Aversion / évitement du contact tactile, de certaines textures ou tissus

Hyper-réactivité ou hypo-réactivité à des stimuli sensoriels (absence de réaction à un bruit fort ou réaction exagérée pour certains bruits, évitement ou attirance pour la lumière, perception accrue des ombres, par exemple)

Exploration / utilisation étrange des « objets » et de l'environnement

Mouvements répétitifs, stéréotypés : gestuelles (battements des mains, mouvements des doigts devant les yeux) ou corporelles (balancements, tournoiements, déambulations, etc.)

Comportement anormalement calme voire passif, bougeant très peu (hypo-mobilité) pour les enfants de moins de 24 mois

Régulation émotionnelle inhabituelle pour l'âge et quel que soit l'environnement :

Intolérance exagérée au changement de l'environnement (Colère, chagrin, réaction de peur, disproportionnés ou sans objet apparent, avec violence (auto ou hétéro-agressivité), non apaisables et répétés.

Colères violentes et répétées, inconsolables

Hyperactivité motrice incontrôlable (se met en danger)

SIGNES D'ALERTE

2 « non » dans 2 domaines différents

Motricité globale, contrôle postural et locomotion

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Monte l'escalier seul en alternant les pieds (avec la rampe) | Oui | Non |
| • Saute d'une marche | Oui | Non |

Motricité fine (cognition)

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Empile huit cubes (sur modèle) | Oui | Non |
| • Copie un cercle sur modèle visuel (non dessiné devant lui) | Oui | Non |
| • Enfile seul un vêtement (bonnet, pantalon, tee-shirt) | Oui | Non |

Langage oral

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Dit des phrases de trois mots (avec sujet et verbe, objet) | Oui | Non |
| • Utilise son prénom ou le « je » quand il parle de lui | Oui | Non |
| • Comprend une consigne orale simple (sans geste de l'adulte) | Oui | Non |

Socialisation

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Prend plaisir à jouer avec des enfants de son âge | Oui | Non |
| • Sait prendre son tour dans un jeu à deux ou à plusieurs | Oui | Non |

Commentaire libre :