

FACTEURS DE HAUT RISQUE DE TND

- Frère ou sœur ou parent de 1er degré ayant un TND
- Exposition prénatale à un toxique majeur du neuro-développement (alcool, certains antiépileptiques)
- Grande prématurité (moins de 32 semaines d'aménorrhée)
- Poids de naissance inférieur à 1 500 g
- Encéphalopathies aigües néonatales (incluant convulsions)
- Anomalies cérébrales de pronostic incertain (ventriculomégalie, agénésie corpus calleux, etc.)

- Microcéphalie (PC < -2 DS, congénitale ou secondaire)
- Infections congénitales ou néonatales (CMV, toxoplasmose, rubéole, méningites / encéphalites, etc.)
- Syndromes génétiques pouvant affecter le neuro-développement
- Cardiopathies congénitales complexes opérées
- Chirurgie majeure (cerveau, abdomen, thorax)
- Ictère néonatal sévère, y compris à terme (bilirubine >400 µmol/l)

COMPORTEMENTS INSTINCTUELS, SENSORIELS, EMOTIONNELS PARTICULIERS

Fonctions physiologiques instinctuelles (sommeil, alimentation) :

- Troubles durables et quasi quotidiens du sommeil (endormissement, réveils nocturnes)
- Grande sélectivité alimentaire inhabituelle pour l'âge (préfère les structures lisses, refuse les morceaux, a une aversion pour les aliments d'une certaine couleur, etc.)
- Difficultés de prises alimentaires (durée des repas très longue, réflexe nauséux massif)

Profil sensoriel et sensori-moteur particulier :

- Aversion / évitement du contact tactile, de certaines textures ou tissus
- Hyper-réactivité ou hypo-réactivité à des stimuli sensoriels (absence de réaction à un bruit fort ou réaction exagérée pour certains bruits, évitement ou attirance pour la lumière, perception accrue des ombres, par exemple)

- Exploration / utilisation étrange des « objets » et de l'environnement
- Mouvements répétitifs, stéréotypés : gestuelles (battements des mains, mouvements des doigts devant les yeux) ou corporelles (balancements, tournoiements, déambulations, etc.)
- Comportement anormalement calme voire passif, bougeant très peu (hypo-mobilité) pour les enfants de moins de 24 mois

Régulation émotionnelle inhabituelle pour l'âge et quel que soit l'environnement :

- Intolérance exagérée au changement de l'environnement (Colère, chagrin, réaction de peur, disproportionnés ou sans objet apparent, avec violence (auto ou hétéro-agressivité), non apaisables et répétés.

Colères violentes et répétées, inconsolables

Hyperactivité motrice incontrôlable (se met en danger)

SIGNES D'ALERTE

3 « non » dans 2 domaines différents

Motricité globale, contrôle postural et locomotion

- | | | |
|--|-----|-----|
| • Saute à pieds joints (au minimum sur place) | Oui | Non |
| • Monte les marches non tenu et en alternant | Oui | Non |
| • Lance un ballon de façon dirigée | Oui | Non |
| • Sait pédaler (tricycle ou vélo avec stabilisateur) | Oui | Non |

Motricité fine et praxies

- | | | |
|---|-----|-----|
| • Dessine un bonhomme têtard | Oui | Non |
| • Copie une croix orientée selon le modèle (non dessiné devant lui) | Oui | Non |
| • Fait un pont avec trois cubes (sur démonstration) | Oui | Non |
| • Enfile son manteau tout seul | Oui | Non |

Langage oral

- | | | |
|--|-----|-----|
| • Utilise le « je » pour se désigner (ou équivalent dans sa langue natale) | Oui | Non |
|--|-----|-----|

- | | | |
|---|-----|-----|
| • A un langage intelligible par une personne étrangère à la famille | Oui | Non |
| • Conjugue des verbes au présent | Oui | Non |
| • Pose la question « Pourquoi ? » | Oui | Non |
| • Peut répondre à des consignes avec deux variables pour retrouver des objets absents (va chercher ton manteau dans ta chambre) | Oui | Non |

Cognition

- | | | |
|---|-----|-----|
| • A des jeux imaginatifs avec des scénarios | Oui | Non |
| • Compte (dénombré) quatre objets | Oui | Non |
| • Sait trier des objets par catégories (couleurs, formes, etc.) | Oui | Non |

Socialisation

- | | | |
|--|-----|-----|
| • Accepte de participer à une activité en groupe | Oui | Non |
| • Cherche à jouer ou interagir avec des enfants de son âge | Oui | Non |

Commentaire libre :